

CONJUNTIVITIS AGUDA

FECHA DE LA EXPOSICIÓN A LA ENFERMEDAD: _____

AVISO PARA LOS PADRES

Es posible que su hijo haya estado en contacto con una persona con conjuntivitis. Si su hijo desarrolla algunos de los signos y síntomas descritos a continuación, por favor consulte con su médico o clínica y avise a la escuela.

Según las normas de la escuela un niño con conjuntivitis no podrá asistir durante la etapa aguda de la infección mientras exista secreción de pus.

Se puede ayudar a prevenir la Conjuntivitis manteniendo la higiene personal y evitando compartir el uso de toallas y de paños faciales, juguetes y otras pertenencias. Es esencial lavarse bien las manos después de ocuparse de cada niño. Los niños con Conjuntivitis Bacterial deberán tomar antibióticos por un mínimo de 24 horas antes de regresar a la escuela. Los niños con conjuntivitis viral o de otro tipo podrán regresar a la escuela con una nota del médico.

AGENTE CAUSAL:	Puede ser una infección bacterial o viral o puede deberse a una alergia, contacto con irritantes (por ej. cloro de una piscina), u otras causas.
SIGNOS Y SÍNTOMAS:	Enrojecimiento e hinchazón del blanco del ojo o de la parte de adentro de los párpados de uno o ambos ojos. Puede tener una secreción amarillenta (bacterial o viral) o clara o no tener ninguna secreción (alérgica o por contacto). A veces puede aparecer una costra en las orillas de los párpados al despertarse por la mañana. Puede haber picazón o dolor o ambos.
PERÍODO DE INCUBACIÓN:	Irregular, usualmente de 1 a 4 días.
PERÍODO DE CONTAGIO:	Las infecciones bacteriales y virales son altamente contagiosas durante el período de secreción.
MÉTODO DE TRANSMISIÓN:	Contacto con secreciones de una persona infectada, por medio de los dedos, ropa u otros artículos contaminados.
MÁS INFORMACIÓN:	Puede obtener más información llamando a la enfermera escolar, al médico o al Departamento de Sanidad del Condado o dirigiéndose a: http://kidshealth.org/parent/infections/eye/conjunctivitis_p2.html , en inglés y en español.