

HOJA INFORMATIVA: Pfizer Beneficios y riesgos de la vacuna contra el COVID-19

Comprenda los riesgos y los beneficios de recibir la vacuna Pfizer contra el COVID-19 de dos dosis, la cual puede impedir que contraiga el COVID-19. Cualquier persona mayor de 12 años puede recibir esta vacuna. Es su decisión recibir esta vacuna. Hable con su proveedor si tiene preguntas.

Acerca de esta vacuna

Al igual que todas las vacunas contra el COVID-19, ésta ha sido autorizada por la FDA para su uso de emergencia dada la gravedad de la pandemia del COVID-19. Esta vacuna es una serie de dos dosis, administradas con tres semanas de diferencia, inyectadas en el músculo.

Antes de recibir la vacuna

Informe al proveedor de vacunación sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- tiene alergias
- tiene fiebre
- tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante
- está inmunodeprimido o toma un medicamento que afecta a su sistema inmunitario
- está embarazada, amamantando o planea quedar embarazada
- ha recibido otra vacuna contra el COVID-19

No debe recibir esta vacuna si:

Tuvo una reacción alérgica severa a cualquier ingrediente de esta vacuna: ARNm, lípidos ((4-hidroxi)butil) azanodiilo bis (hexano-6,1-diil) bis (2-hexildecanoato), 2 [(polietilenglicol) -2000] -N, N-ditetradecilacetamida, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-3-fosfamida Hocolina y colesterol), cloruro de potasio, potasio monobásico fosfato, cloruro sódico, fosfato dibásico de sodio dihidrato y sacarosa.

Los beneficios de esta vacuna

En un ensayo clínico en curso, se ha demostrado que esta vacuna previene la enfermedad, hospitalización o muerte por el COVID-19 después de dos dosis administradas con tres semanas de diferencia. Actualmente se desconoce la duración de la protección contra el COVID-19.

Riesgos asociados a esta vacuna

- **Efectos secundarios generales:** Los efectos secundarios reportados con esta vacuna incluyen reacciones alérgicas no graves (sarpullido, picor, urticaria, hinchazón de la cara), dolor en el lugar de la inyección, hinchazón y enrojecimiento, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor articular, fiebre, náuseas, sensación de malestar, inflamación de los ganglios linfáticos, diarrea, vómitos y dolor en el brazo.
- **Reacción alérgica severa:** Existe una posibilidad remota de que la vacuna pueda causar una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, hinchazón de la cara y la garganta, latido cardíaco rápido, erupción grave en todo el cuerpo, mareos, debilidad), que suele ocurrir de unos minutos a una hora después de recibir la dosis.

Si usted experimenta efectos secundarios

Si experimenta una reacción alérgica grave, llame al 9-1-1 o vaya al hospital más cercano. Llame al proveedor de vacunación o a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o no desaparece.

Otras opciones para prevenir el COVID-19

Es su decisión el recibir esta vacuna y no recibirla no cambiará su atención médica vigente. Existen otras vacunas disponibles para prevenir el COVID-19.

Más información

Visite www.pfizer.com/science/coronavirus/vacune-esfuerzos o www.cdc.gov/coronavirus

Llame al 1-800-438-1985



Adaptado de la [hoja informativa de la FDA para receptores y auxiliares de cuidado personal](#)